

AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA INFANTO PUBERAL (GIP)

- ◇ Idade \leq 18 anos
- ◇ Vulvovaginites recorrentes
- ◇ Fusão de pequenos lábios
- ◇ Puberdade Precoce (desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade).
- ◇ Puberdade Retardada (início dos caracteres sexuais secundários após 14 anos de idade).
- ◇ Amenorréias primárias (paciente que nunca menstruo)
- ◇ Amenorréias secundárias (ausência de menstruação por mais de 90 dias, com história prévia de ciclos menstruais regulares)
- ◇ Distúrbios menstruais persistentes por pelo menos 6 meses (com comprovação por calendário menstrual e persistente após 2 anos da menarca) e/ou sinais clínicos de hiperandrogenismo
- ◇ Hemorragias uterinas disfuncionais da puberdade
- ◇ Malformações genitais (hímen imperfurado, ausência de vagina, orifício na vulva único, septo vaginal transversal ou longitudinal, ausência de útero ou presença de útero rudimentar, septado, didelfo, unicorno, bicorno, etc).
- ◇ Disgenesias gonadais
- ◇ Intersexualidade
- ◇ Dismenorréia
- ◇ Galactorréia

03/09/2010