

AMBULATÓRIO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP)

1. Deverão ser encaminhados pacientes com o diagnóstico de Hipertensão Pulmonar identificada através de ecocardiografia (obrigatoriamente) ou cateterismo cardíaco direito, sem etiologia definida, para devida investigação.
2. Poderão ser encaminhados pacientes com o diagnóstico de Hipertensão Pulmonar com as seguintes etiologias para avaliação da utilização de medicação específica:
 - a. Hipertensão Pulmonar associada à doença do colágeno.
 - b. HIV
 - c. Hipertensão portal
 - d. Esquistossomose
 - e. Cardiopatia congênita com inversão do fluxo cardíaco (Síndrome de Eisenmenger)
 - f. Hipertensão Pulmonar tromboembólica
 - g. Hipertensão Pulmonar associada a drogas ou toxinas
3. Não serão aceitos pacientes com Hipertensão Pulmonar sabidamente associada à cardiopatia esquerda (disfunção sistólica, diastólica ou valvulopatia) ou associada à doença pulmonar (doença pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar intersticial, distúrbios respiratórios do sono, outras doenças pulmonares que cursem com hipoventilação e hipoxemia). Estes pacientes devem ser direcionados para os ambulatórios de cardiologia e pneumologia respectivamente.

20/12/2011