

AMBULATÓRIO DE OBESIDADE INFANTIL – OBIN

- Índice de Massa Corporal (IMC - P/E^2) estiver maior que o percentil 95 da curva de referência de IMC ou mais 3 desvios padrão da curva da OMS.

- No OBIN o encaminhamento poderá ser feito até antes de completar 15 anos, para os portadores de:

1- Obesidade endógena (secundária) e suspeita de obesidade monogênica. Nestes casos, a estatura é baixa para a idade/família e a puberdade é atrasada.

- a. Obesidade endógena por deficiência de GH
- b. Obesidade endógena por Cushing
- c. Obesidade endógena por Hipotireoidismo
- d. Obesidade endógena por Síndrome de Prader Willi

2- Portadores de obesidade exógena (primária) com comorbidades:

- e. Hipertensão arterial confirmada. Pressão arterial medida por 3 vezes em dias diferentes e comparada com tabelas de referência segundo altura, sexo e idade.
- f. Dislipidemia. Colesterol total acima de 200mg/dl, Triglicérides acima de 150 mg/dl
- g. Diabetes mellitus. Glicemia de jejum acima de 126 mg/dl (2 medidas).
- h. Doenças ortopédicas e distúrbios psicológicos, encaminhar para a triagem da especialidade da doença.

30/07/2013