

AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA COLUNA VERTEBRAL INFANTIL (ORCI)

1. **Deformidades:**

- Escoliose: - pacientes com deformidade no plano frontal, previamente avaliados em serviço secundário e/ou primário e com exames de imagem recentes (radiografias);
- Cifose: - pacientes com deformidade no plano sagital, previamente avaliados em serviço secundário e/ou primário e com exames de imagem recentes (radiografias).

2. **Infecção:** - pacientes com diagnóstico ou suspeita de infecção na coluna vertebral, previamente avaliados em serviço primário e/ou secundário e com exames de imagem (radiografia e tomografia e/ou ressonância magnética).

3. **Tumor:** - pacientes com diagnóstico ou suspeita de tumor na coluna vertebral, previamente avaliados em serviço primário e/ou secundário e com exames de imagem (radiografia e tomografia e/ou ressonância magnética).

4. **Espondilolise/espondilolistese:** - pacientes com diagnóstico ou suspeita de despondilolise/espondilolistese na coluna vertebral, previamente avaliados em serviço primário e/ou secundário e com exames de imagem (radiografia e tomografia e/ou ressonância magnética).

5. **Dor lombar/ciatalgia:** - pacientes com dor lombar ou ciatalgia que foram avaliados e submetidos a tratamento em serviço primário e/ou secundário e não apresentam melhora.

6. **Hérnia discal:** - pacientes com diagnóstico ou suspeita de hérnia discal que foram previamente avaliados em serviço primário e/ou secundário e com exames de imagem (radiografia e tomografia e/ou ressonância magnética).